POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Sałata | Letuce

Latuca sativa L.

GŁOWIASTA MASŁOWA / *BUTTERHEAD*

ANIELKA

- Uniwersalna odmiana szklarniowa, szczególnie przydatna do uprawy na zbiór w styczniu/lutym
- Dobrze przyrasta przy niższym natężeniu światła w okresie zimowym
- Liście lekko pomarszczone, jasnozielonożółte z silnym połyskiem
- Główki zamknięte, lekko owalne, średnio zwięzłe
- Duży udział główek handlowych w plonie ogólnym
- Odmiana odporna na rasy mączniaka rzekomego NL 1-7, 9-15
- Nie wykazuje skłonności do gromadzenia azotanów

- *Butterhead, for greenhouse, useful for harvesting in January / February*
- *Early variety*
- *Grows well despite of lower light intensity during the winter*
- *Leaves slightly wrinkled, light green with a high shine*
- *Closed head, medium compact*
- *A large share of commercial heads in total yield*
- *Resistant to downy mildew races NL 1-7, 9-15*
- *Tendency to accumulation of nitrates - very low*

ATENA

- Uniwersalna odmiana szklarniowa, do zbioru wczesnozimowego, zimowego i późnozimowego
- Przystosowana do uprawy w warunkach niższego natężenia światła i obniżonej temperatury
- Pierwsze główki handlowe o masie ponad 150 g osiąga w okresie 30 dni od posadzenia
- Główki kulisto owalne, duże, ścisłe, twarde, zamknięte
- Liście ciemnozielone, o gładkiej powierzchni, delikatne
- Zmniejszona tendencja do kumulacji azotanów
- Odporna na mączniaka rzekomego sałaty NL 1-6, 9, 11-14

- *Butterhead, universal greenhouse variety*
- *For early winter, winter and late winter production*
- *Suitable for production under lower light intensity and low temperature*
- *30 days from transplanting to first harvest*
- *95-100% of marketable yield in total yield*
- *Large, closed and compact heads*
- *Dark green leaves with smooth surface, delicate*
- *Tendency to accumulation of nitrates – very low*
- *Resistant to downy mildew NL 1-6, 9, 11-14*

BONA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
- Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 350-500 g
- Liście jasne, średnio pęcherzykowate
- Równomiernie osiąga wielkość handlową
- Tolerancyjna na wirus CMV
- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Późno wybija w pędy kwiatostanowe
- Skłonność do gromadzenia azotanów - bardzo mała
- Polecana do uprawy wczesnowiosennej w tunelach
- Przeznaczona do uprawy polowej we wszystkich terminach

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 deys*
- *Circular, large, compact head, 350-500 g weight*
- *Leaves bright, medium blistering*
- *Tolerant to CMV virus*
- *Resistant to bad weather conditions*
- *Late bolting*
- *Tendency to accumulate nitrates - very low*
- *Recommended for early growing in the plastic tunnels and spring and autumn for open field*

ISMINA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 40-50 dni
- Przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej
- Główki szerokoeliptyczne, otwarte
- Liście jasnozielone, silnie pęcherzykowate, wyjątkowo dekoracyjne, bardzo smaczne, chrupiące i słodkie

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 40-50 days*
- *Broad elliptic heads, open*
- *Light green leaves, strong blistering*
- *Leaf very decorative, very tasty, crunchy and sweet*
- *Designed for spring and autumn growing*

KRÓLOWA MAJOWYCH

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
- Dość odporna na mącznika rzekomego i średnio odporna na szarą pleśń
- Tworzy duże, zamknięte główki o żółtawozielonych, jędrnych liściach
- Odmiana polecana do wczesnej uprawy w polu i późniejszej pod osłonami (wymaga silnego wietrzenia)

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days*
- *Resistant to downy mildew and tolerant to grey mould*
- *Head large, closed with yellow green, firm leaves*
- *Recommended for early growing in the field and later under cover (requires a strong air circulation)*

MARTA ZIELONA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
- Bardzo duży udział pierwszego zbioru w plonie ogólnym
- Liście zielone, lekko pomarszczone, delikatne
- Główka bardzo duża, twarda, kulisto-spłaszczona
- Wysoka wytrzymałość na silne i długotrwałe nasłonecznienie i wysoką temperaturę
- Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-6, 13-15
- Przydatna do wczesnowiosennej, wiosennej i jesiennej uprawy pod folią oraz w polu bez osłon

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days*
- *Good yield structure*
- *Leaves are green, delicate and slightly wrinkled*
- *Large head, closed, round*
- *Adapted to sunlight and high temperature conditions*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-6, 13-15*
- *White seeds*
- *Suitable for early spring; spring and autumn production under cover and open field*

MARYSIEŃKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
- Liście jasnozielone do zielonych, prawie gładkie do lekko pęcherzykowatych, delikatne
- Główka ładnie zamknięta, okrągła, średnio zwięzła
- Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+9-11+13-15
- Bardzo wytrzymała na silne nasłonecznienie i wysoką tempraturę
- Przeznaczona do uprawy pod folią oraz w polu, w okresie wczesnowiosennym i jesiennym

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days*
- *Light green leaves, delicate; very weak blistering*
- *Closed head, circular, medium compact*
- *Adapted to sunlight and high temperature conditions*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7+9-11+13-15*
- *White seeds*
- *Suitable for early spring and autumn production under cover and open field*

MICHALINA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 40-45 dni
- Główki duże, kulisto-spłaszczone, żółtozielone, o masie 350-400 g
- Równomiernie osiąga wielkość handlową
- Skłonność do gromadzenia azotanów - mała
- Tolerancyjna na wirus CMV, tolerancyjna na suszę
- Przeznaczona do uprawy pod folią oraz w polu w okresie wczesnowiosennym i jesiennym

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 40-45 days*
- *Heads large, round, yellow green, 350-400 g weight*
- *Tendency to accumulate nitrates - low*
- *Tolerant to CMV virus, tolerant to drought*
- *Suitable for early production under cover and open field and summer production for open field*

MIRA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 45-50 dni
- Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 300-400 g, barwy czerwono-zielonej
- Odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne
- Późno wybija w pędy kwiatostanowe
- Skłonność do gromadzenia azotanów - mała
- Przeznaczona do wczesnej uprawy polowej

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 deys*
- *Head large, circular, close, red-green, 300-400 g weight*
- *Resistant to diseases and bad weather conditions*
- *Late bolting*
- *Tendency to accumulate nitrates - low*
- *Designed for early open field production*

MODESTA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 50-55 dni
- Główka eliptycznie wydłużona, ścisła i dobrze zamknięta, masa ok. 1000 g
- Kształtem przypomina sałaty rzymskie
- Liście jasnozielone z silnym nalotem woskowym, bez połysku
- Liść pęcherzykowaty, o konsystencji krucho-masłowej, brzeg prawie gładki
- Przeznaczona do uprawy wiosennej w gruncie i tunelu foliowym

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 50-55 days*
- *Broad elliptic head, well closed, 1000 g weight*
- *Head shape similar to cos lettuces*
- *Light green leaves with a strong waxy coating, without gloss*
- *Leaf: medium blistering, texture between crisp and butterhead*
- *For spring production under cover and open field*

NAWOJKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-40 dni
- Liść cienki, delikatny, silnie pęcherzykowaty
- Główka otwarta, zwięzła, szerokoeliptyczna, o masie 250-350 g
- Przeznaczona do uprawy wiosennej, nadaje się do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 35-40 days*
- *Leaf: delicate, thin, strong blistering*
- *Open head, compact, broad elliptic, 250-350 g weight*
- *For spring production under cover and open field*

REGINA ZIELONA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 45-50 dni
- Liście zielone, bez antocyjanu, o słabym połysku
- Główka bardzo duża, twarda, zamknięta
- Długo pozostaje w dojrzałości użytkowej nie wybijając w pędy kwiatostanowe
- Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+10-13
- Odmiana polowa, przydatna do uprawy od wczesnej wiosny do jesieni, szczególnie latem

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 deys*
- *Green leaves with low gloss*
- *Head very large, compact and closed*
- *Very slow bolting*
- *Resistant to races of downy mildew NL 1-7 +10-13*
- *Black seeds*
- *For spring, summer and autumn production in open field*

SABA

- Charakteryzuje się intensywnym wzrostem
- Zabarwienie liści jasnozielone, bez antocyjanu, o słabym połysku
- Główka bardzo duża, twarda, zamknięta, ciężka i zwięzła
- W strukturze plonu bardzo duży udział główek o masie większej niż 350 g
- Główka długo pozostaje w dojrzałości użytkowej nie wybijając w pędy kwiatostanowe
- Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+10-13
- Odmiana polowa do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej

- *Intensive growth*
- *Light green leaves, with light gloss*
- *Head very large, hard, closed, heavy and compact*
- *Head approximately 350 g*
- *Very slow bolting*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7 +10-13*
- *White seeds*
- *For spring, summer and autumn production in open field*

CUD VOORBURGU

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 60-65 dni
- Główki kuliste do wydłużonych, duże, ścisłe
- Liście żółtawobiałozielone, delikatne, kruche i smaczne
- Polecana do uprawy polowej na zbiór późnojesienny

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 60-65 days*
- *Round heads , large, compact*
- *Yellowish-white-green leaves, delicate, crisp and tasty*
- *Recommended for open field cultivation for late autumn harvest*

MARYNA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 70 dni
- Główki kuliste, półotwarte, zwięzłe, duże o masie ok. 750 g
- Liście silnie pęcherzykowate, ze słabo falowanym brzegiem i słabym połyskiem
- Na liściach zewnętrznych (głównie na szczycie główki) występuje antocyjan
- Odporność na mączniaka rzekomego i szarą pleśń - średnia
- Polecana do uprawy w gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest - approx. 70 days*
- *Round, semi-open, firm large heads with a weight of approx. 750 g*
- *Leaves strongly blistering, with a slightly wavy edge and a low gloss*
- *Anthocyanin is present on the outer leaves (mainly at the top of the head)*
- *Resistance to downy mildew and grey mold - average*
- *Recommended for cultivation in the open field*

ROZALKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 60-65 dni
- Główki zamknięte o masie ok 600g
- Liście zewnętrzn e o barwie jasnozielonej, bez zabarwienia antocyjanowego
- Bardzo długa przydatność konsumpcyjna
- Bardzo późno wybija w pędy nasienne
- Odporność na mączniaka rzekomego i szarą pleść - średnia
- Polecana do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 60-65 days*
- *Closed heads with a weight of about 600 g*
- *Light green outer leaves without anthocyanin tint*
- *Very long shelf life*
- *Seed inflorescence shoots very slow bolting*
- *Resistance to downy mildew and grey mold - medium*
- *Recommended for cultivation in the open field from spring to autumn*

NOCHOWSKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 35-40 dni
- Wysiew od kwietnia do maja oraz w sierpniu (na zbiór jesienny) bezpośrednio do gruntu
- Główka kulista, twarda, dobrze zamknięta, średnio duża do dużej
- Liście duże, żółtawozielone, delikatne, bardzo smaczne
- Wytrzymała na długi dzień i wysoką temperaturę, a po uformowaniu główek długo nie wybija w pęd kwiatostanowy
- Do całosezonowej uprawy w gruncie

- *The vegetation period from planting to harvest is approx. 35-40 days*
- *Sowing from April to May and August (for autumn harvest) directly into the ground*
- *Round head, firm well, hard, well closed, medium-large to large*
- *Large, yellowish-green leaves with a delicate texture of tissue, very tasty*
- *Withstands a long day and high temperature, very slow bolding*
- *For all-season cultivation in open field*

OWACJA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 45-50 dni, bardzo plenna
- Główka duża, dobrze wypełniona, jasnozielona, zamknięta u podstawy, długo zachowuje wartość handlową
- Bardzo późno tworzy pędy kwiatostanowe
- Liście bardzo smaczne, nie gorzknieją
- Wysiew marzec – lipiec do gruntu; można uprawiać na zbiór jesienny
- Szczególnie polecana do uprawy w polu i pod nieogrzewane osłony - z przeznaczeniem na zbiór wiosenny

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 days, very fertile*
- *Large, light green, vell closed at the base, long-lasting commercial value, very tasty, leaves do not turn bitter*
- *Very slow bolting*
- *Especially recommended for cultivation in the field and under unheated covers - intended for spring harvesting*
- *Sowing in March - July into the ground; can be grown for autumn harvest*

MILLY ELENA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 45-50 dni, bardzo plenna
- Wysiew w szklarni od stycznia; w gruncie - do połowy maja; można uprawiać na zbiór jesienny
- Główka duża, okrągła lub poprzecznie eliptyczna, zamknięta, o żółtozielonych nie gorzkniejących liściach
- Późno wybija w pędy nasienne
- Przeznaczona do uprawy pod osłonami i w gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 days, very fertile*
- *Sowing in a greenhouse from January; in the open field - until mid-May; can be grown for autumn harvest*
- *Large, round or transversely elliptical head, with yellow-green leaves, closed*
- *Very slow bolting*
- *Very tasty, leaves do not turn bitter*
- *Intended for cultivation under covers and in the open field*

ZINA

- Unikatowa odmiana, która przetrwa w gruncie przez całą zimę bez osłon
- Wysiew późnym latem (sierpień-wrzesień), zbiór wczesną wiosną (kwiecień-maj) w terminie porównywalnym do odmian uprawianych w tunelach foliowych
- Odmiana nadaje się również do uprawy w gruncie z siewu wczesnowiosennego, główka kształtna, zbita
- Główka kształtna, zbita
- Liście średniej wielkości, jasnozielone ze słabym połyskiem, kruche, gładkie, miękkie, ze słabo pofałdowanymi brzegami

- *A unique variety that will survive in the ground through the winter without any covers*
- *Sowing in late summer (August-September), harvesting in early spring (April-May) at a time comparable to the varieties grown in foil tunnels*
- *The variety is also suitable for cultivation in the open field after early spring sowing, firm compact head*
- *Medium-sized leaves, light green with a low gloss, smooth, with slightly folded edges, tasty*

GŁOWIASTA KRUCHA / *ICEBERG*

BAKATA

- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 35-40 dniach od posadzenia w tunelu i po 45-50 dniach - w polu
- Soczysto zielone zabarwienie liści zewnętrznych i główki
- Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym
- Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g
- Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną
- Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon

- *35-40 days from transplanting to harvest in the tunnel; 45-50 days - in the field*
- *Green leaves and heads*
- *Leaf nearly smooth, crispy, with the undulated margin*
- *Head compact, closed, more than 1000 g weight*
- *Very slow bolting*
- *Recommended for early spring (in plastic tunnels), spring, summer and autumn production in the open field without covers*

CARMINA

- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 40-45 dniach od posadzenia - w tunelu i po 50-55 dniach - w polu
- Liście - jasnozielone, z wyraźnym odcieniem antocyjanowym na brzegach liści zewnętrznych, kruche, o gładkiej i lśniącej powierzchni, pocinane
- Główki duże, zwarte, o masie powyżej 1000 g
- Przydatna również do uprawy letniej - jest odporna na wybijanie pędów kwiatostanowych i zagniwanie dolnych liści
- Odmiana dekoracyjna, bardzo smaczna, nadaje się do transportu
- Polecana do uprawy całorocznej (wczesną wiosną w tunelach, od wiosny do jesieni w polu)

- *40-45 days from transplanting to harvest in the tunnel; 50-55 days - in the field*
- *Light green leaves, with an anthocyanin color at the edges of the outer leaves*
- *Leaves, with a smooth and shiny surface*
- *Heads large, compact, more than 1000 g weight*
- *Very slow bolting, adapted to bad weather conditions*
- *Decorative variety, very tasty, suitable for transport*
- *Recommended for early spring production in the tunnels and from spring to autumn in the open field*

JULECZKA

- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 30-35 dniach od posadzenia w tunelu i po 40-45 dniach - w polu
- Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g
- Jasnozielone zabarwienie liści zewnętrznych główki
- Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym
- Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną
- Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon

- *30-35 days from transplanting to harvest in the tunnel; 40-45 days - in the field*
- *Compact heads, closed, firm, more than 1000 g weight*
- *Light green leaves*
- *Leaves smooth, shiny surface*
- *Leaves with undulated margin*
- *Very slow bolting*
- *Recommended for early spring production (in the plastic tunnels and from spring, summer and autumn grooving in the open field*

KINGA

- Odmiana średniowczesna
- Główka duża, twarda, spłaszczona o masie 750-1200 g, soczysta i krucha
- Liście grube, intensywnie zielone, silnie pęcherzykowate, o pofalowanym brzegu
- Nadaje się do uprawy we wszystkich terminach, również wczesnowiosennych w nieogrzanych tunelach.

- *Medium early variety*
- *Large head, compact, 750-1200 g weight, crispy*
- *Thick leaves, intensive green with undulated margin and strong blisters*
- *For all production period - also for early spring growing under covers*

KWIRYNA

- Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-50 dniach od wysadzenia
- Do uprawy wiosennej w nieogrzewanym tunelu foliowym oraz do uprawy gruntowej
- Główka średniej wielkości o masie 600-650 g, lekko spłaszczona (poprzecznie eliptyczna)
- Liść jasnozielony z lekkim połyskiem, słabo pęcherzykowaty, prawie gładki, brzeg średnio falowany
- Wysokie walory smakowe, słodka, soczysta, bez goryczki

- *45-50 days from transplanting harvest*
- *Early variety*
- *For spring production under covers and open field*
- *Head of medium size, 600-650 g weight, light elliptic*
- *Light green leaves with a slight sheen, weak blistering and undulation of margin*
- *Taste, sweet without bitterness*

LUDWINA

- Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 50-55 dniach od wysadzenia
- Główka średniej wielkości, jasna, ścisła o średniej masie 600-900 g
- Brzeg liścia silnie falowany
- Delikatna w smaku, bardzo soczysta, bez goryczki
- Średnia skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe
- Nie gromadzi azotanów
- Przeznaczona do uprawy wiosennej, polecana do uprawy latem

- *50-55 days from transplanting harvest*
- *Medium size head, bright, compact with an average weight of 600-900 g*
- *Strong undulation of leaf margin*
- *Delicate, flavour, without bitterness*
- *Medium bolting*
- *Tendency to accumulation of nitrates – low*
- *For spring and summer production*

RZYMSKA / *COS*

LIWIA

- Odmiana średniopóźna o pokroju wzniesionym
- Główka eliptyczna, duża
- Liście zewnętrzne skórzaste, jasne, smaczne,, soczyste i słodkie
- Średnia masa główki bez liści zewnętrznych 750-1000 g
- Słabo porażana przez choroby grzybowe

- *Medium late variety, erect type*
- *Head elliptic, big, bright, very tasty and sweet,*
- *The average weight of the head without the outer leaves 750-1000 g*
- *Tolerant to fungal diseases*

LIŚCIOWA / *LEAF*

FLAMENCO

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 40-45 dni
- Liście bardzo dekoracyjne, czerwono-zielone, przypominające liście dębu
- Polecana do uprawy na wiosnę, lato i jesień
- Nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatowe
- Odporna na kilka ras mączniaka rzekomego
- Liście można obrywać stopniowo w miarę ich rozwijania
- Wysiew od lutego do lipca, najlepiej co dwa tygodnie by maksymalnie wydłużyć okres zbiorów (od maja do października)

- *The vegetation period from planting to harvest is approx. 40-45 days*
- *A variety with very decorative, red - oak leaves*
- *Recommended for spring, summer and autumn cultivation*
- *Very slow bolting*
- *Resistant to some race of downy mildew*
- *Leaves can be stripped gradually*
- *Sowing from February to July, preferably every two weeks to maximize the harvest period (May to October)*

ŁODYGOWA / *STALK LETTUCE*

KAROLA

- Od siewu do zbioru ok. 70-90 dni / odmiana późna
- Częścią jadalną jest obficie ulistniona, mięsista łodyga - tzw. głąbik oraz liście (mniej delikatne od innych sałat)
- Łodyga przydatna do spożyciu po osiągnięciu wysokości 30 cm
- Polecana do bezpośredniej konsumpcji w stanie surowym lub w formie gotowanej, kiszonej lub konserwowej
- Polecana do uprawy polowej w rozstawie 50x30 cm

- *From sowing to harvesting approx. 70-90 days / late variety*
- *The edible part is profusely leafy, fleshy stem - the so-called stump and leaves (less delicate than other salads)*
- *The stalk is suitable for consumption after reaching the height of 30 cm*
- *Recommended for direct consumption raw or cooked, pickled or canned*
- *Recommended for field cultivation with a spacing of 50x30 cm*

PURPURAT

- Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-55 dniach od posadzenia
- Główną częścią jadalną jest gruba i soczysta łodyga
- Łodyga długości około 40 cm z czerwonawą skórką i biało zielonym miąższem
- Liść bardzo dekoracyjny, wiśniowy, z silnym połyskiem
- Przeznaczona do wiosennej i letniej uprawy w polu
- W wysokiej temperaturze pędy drewnieją, dlatego zalecany jest jak najwcześniejszy wysiew

- *The main edible part - thick and tasty stem*
- *Stem - approximately 40 cm height, reddish skin and white green flesh*
- *Very decorative and cherry color leaves with high gloss*
- *Suitable for spring and summer growing in the field*
- *At high temperatures makes woody stems, therefore the earliest sowing is recommended (to the ground in April or under cover in mid-March)*
- *45-55 days from transplanting to harvest*

Sałata - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / *Lettuce - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties*

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Ilość dni od wysadzenia do zbioru *Days from planting to harvest*	Produkcja / *Cultivation*					Główka *Head*	
			Termin siewu / *Sowing time*				Miejsce uprawy *Growing place*	Waga (g) *Wieght (g)*	Kolor liści *Leaves colour*
			Wczesna wiosna *Early spring*	Wiosna *Spring*	Lato *Summer*	Jesień *Autumn*			
SAŁATA GŁOWIASTA MASŁOWA / *BUTTERHEAD*									
ANIELKA	PLANTICO						szklarnia / greenhouse		
ATENA	PLANTICO						szklarnia / greenhouse		
BONA	PLANTICO	35-45	***	***	***	**	grunt, tunel / open field / tunnel	350-500	żółtozielony / yellow-green
CUD VOORBURGU	POLAN	średniopóźna	-	***	***	-	grunt / open field, open field / greenhouse	100-200	żółtobiałozielony / yellow-white-green
ISMINA	PLANTICO	40-50	***	***	*	**	grunt, tunel / open field / tunnel	250-400	jasnożółtozielony / ligh yellow-green
JUSTYNA POL	POLAN	wczesna	***	-	***	***	grunt, szklarnia / open field / greenhouse	300-400	jasnozielony / light green
KRÓLOWA MAJOWYCH	PLANTICO	35-45	***	***	-	***	grunt, tunel / open field / tunnel	250	żółtozielony / yellow-green
MARTA ZIELONA	PLANTICO	35-45	***	**	-	***	grunt, tunel / open field / tunnel	300-350	zielony / green
MARYNA	POLAN	średniopóźna		***		***	grunt / open field	700-800	zielony / green

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Ilość dni od wysadzenia do zbioru *Days from planting to harvest*	Produkcja / *Cultivation*					Główka *Head*	
			Termin siewu / *Sowing time*				Miejsce uprawy *Growing place*	Waga (g) *Wieght (g)*	Kolor liści *Leaves colour*
			Wczesna wiosna *Early spring*	Wiosna *Spring*	Lato *Summer*	Jesień *Autumn*			
MARYSIEŃKA	PLANTICO	35-45	***	***	-	***	grunt, tunel / open field / tunnel	350	jasnozielony / light green
MICHALINA	PLANTICO	40-45	**	***	**	-	grunt, tunel / open field / tunnel	350-400	żółtozielony / yellow-green
MILLY ELENA	SPÓJNIA	45-50	**	***	**	-	grunt, tunel / open field / tunnel		jasnożółtozielony / ligh yellow-green
MIRA- czerw.	PLANTICO	45-50	***	***	***	-	grunt,tunel / open field, tunnel	300-400	ciemnowiśniowozielony / deep-cherry-green
MODESTA	PLANTICO	50-55	***	**	-	**	grunt, tunel / open field / tunnel	400-600	matowozielony / dull green
NAWOJKA	PLANTICO	35-40	***	***	-	**	grunt, tunel / open field / tunnel	250-350	zielony / green
NOCHOWSKA	SPÓJNIA	35-40	*	***	***	**	grunt / open field		żółtozielony / yellow-green
OLEŃKA	POLAN	średniopóźna	-	***	***	***		450-550	żywozielony / intense green
OWACJA	SPÓJNIA	45-50	**	***	**	**	grunt, tunel / open field / tunnel		żółtozielony / yellow-green
REGINA ZIELONA	PLANTICO	45-50	-	**	***	***	grunt / open field	350-450	zielony / green
ROZALKA	POLAN	średniopóźna	-	***	***	***	grunt / open field	500-600	jasnozielony / light green
SABA	PLANTICO	45-50	-	**	***	***	grunt,tunel / open field, tunnel	350-450	jasnozielony / light green
SZANSA	SPÓJNIA	35-40	***	**	**	***	tunel / tunnel	260-300	żółtozielony / yellow-green
ZINA	SPÓJNIA		-	-	***	***	grunt / open field	210-230	jasnozielony / light green
SAŁATA GŁOWIASTA KRUCHA / *ICEBERG*									
BAKATA	PLANTICO	45-50	**	***	**	***	grunt,tunel / open field / tunnel	>1000	zielony / green
CARMINA	PLANTICO	50-55	**	***	**	***	grunt,tunel / open field / tunnel	>1000	jasnozielony z odcieniem antocyjanowym / light green with anthocyan tint
JULECZKA	PLANTICO	40-45	**	***	**	**	grunt,tunel / open field / tunnel	>1000	jasnozielony / light green
KINGA	PLANTICO	50-55		***	**	***	grunt,tunel / open field / tunnel	750-1200	zielony / green
KWIRYNA	PLANTICO	45-50	**	***		***	grunt,tunel / open field / tunnel	>600	jasnozielony / light green
LUDWINA	PLANTICO	50-55	**	***	**	*	grunt,tunel / open field / tunnel	>600	jasnożółtozielony / ligh yellow-green
SAŁATA RZYMSKA / *COS LETTUCE*									
LIWIA	PLANTICO	50-60	**	***	**		grunt / open field	>750	zielony / green
SAŁATA LIŚCIOWA / *LEAF LETTUCE*									
FLAMENCO	SPÓJNIA	40-45	***	***	**		grunt / open field		czerwonozielony / red-green
SAŁATA ŁODYGOWA-SZPARAGOWA / *STALK LETTUCE*									
KAROLA	POLAN	70-90		***		***	grunt / open field	wys. 75-85cm	ciemnozielona / dark green
PURPURAT	PLANTICO	45-55		***	**		grunt / open field	wys. ok. 40cm	wiśniowy z silnym połyskiem / cherry with strong gloss

* przydatna / *suitable* ** polecana / *recommended* *** przeznaczona / *appropriate*

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; **e-mail:** hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
tel. 12 623 38 31; **e-mail:** handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
tel. 24 253 35 87; **e-mail:** sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
tel. 12 282 50 56; **e-mail:** krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
tel. 61 283 56 55; **e-mail:** handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:
tel. 17 861 14 58; **e-mail:** rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; **e-mail:** trade@plantico.pl

Sklep internetowy: **sklep.plantico.pl**

www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl